

研成细粉过 100 目筛。②生地用冷沸水淹过药面浸泡 2 次，合并 2 次滤液。③其余药物加水淹过药面煎熬 3 次，合并 3 次滤液与②内滤液共浓缩成糖浆状，量体积，加入乙醇使含醇量为 50% 搅匀，密闭放置一夜过滤。④含醇药液回收乙醇，放于水浴上浓缩至约 8000 毫升与①内细粉混匀制成颗粒，于 60~70℃ 烘干压片。共制 52800 片，每片相当于全生药 0.6 克。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 6~8 片。

〔功效〕 凉血，养肝。

〔主治〕 荧星满目，眼前白花飞舞等症。

〔禁忌〕 孕妇慎服。

### 方 25 益视片（成都中医学院附属医院）

〔组成〕 楮实子、菟丝子各 16000 克，丹参、茺蔚子各 12000 克，五味子、车前仁各 4000 克，枸杞 10000 克，木瓜、青皮各 6000 克，三七粉 2000 克。

〔制法〕 丹参、木瓜、三七粉共粉碎过 80~100 目筛。其余药物煎煮 3 次，首次 1 小时，2、3 次各半小时，合并滤液浓缩至稠膏状，加入白陶土 4000 克及氧化镁 4000 克，再将上述药粉加入拌匀制粒，过 14 目筛烘干（温度 60~80℃），称重加入 1% 硬脂酸镁，过 18 目筛，整粒即可压片。共压 116666 片，每片约重 0.3 克。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 4~6 片。

〔功效〕 滋养肝肾，明目。

〔主治〕 用于视瞻昏渺，云雾移睛，青盲，视近怯远，视远怯近。

### 方 26 明目片（成都中医学院附属医院）

〔组成〕 珍珠母、草决明、蒲公英各 20000 克，赤芍、木

贼、麦冬各 10000 克，青箱子 12000 克，栀子 6000 克，荆芥 4000 克。

〔制法〕 赤芍、栀子共粉碎过 80~100 目筛。其余药物煎煮 3 次，首次 1 小时，第 2、3 次各半小时，合并滤液浓缩成稠膏状，将稠膏与上述药粉混匀，过 14 目筛制粒烘干（温度为 60℃）。称重加入 1%硬酯酸镁，再过 16 目筛，整粒即可压片。共压 101800 片，每片约重 0.3 克。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 4~6 片。

〔功效〕 平肝清热，明目退翳。

〔主治〕 用于目生云翳，聚星障，花翳目陷等。

### 方 27 眼科 I 号片（华西医科大学附属医院）

〔组成〕 银花、白芷、赤芍、川芎、郁金、茯苓、泽泻、黄芩、羌活、防风、荆芥、桑皮、蝉蜕各 4500 克，芦根、连翘、蒺藜、蒲公英、鱼腥草、板蓝根 野菊花各 6000 克。

〔制法〕 ①取银花、白芷粉碎过 80~100 目筛，细粉（作吸收剂）备用。②取方中后 18 味药和粉碎后的粗粉用煮提法加水煮提 6 次，每次煮沸 1 小时，过滤，合并 6 次滤液。浓缩至稠膏状（大约 20000 毫升）放冷。③将稠膏加乙醇沉淀，使含醇量达到 60%，静置 24 小时过滤，回收乙醇，并挥发至无醇味，浓缩至稠膏状。④将细粉和稠膏混匀，分成小块，100~120℃干燥，粉碎制粒过 12~14 目筛网。⑤取制好的颗粒加入 0.15%硬脂酸镁、3%滑石粉混匀，压片即得。片重 0.15 克，含原生药 8.4 克。共制 12000 片。

〔用法〕 口服。每日 3 次，每次 8 片。温水送服。

〔功效〕 清热散风，化湿消炎。

〔主治〕 外眼部和眼前段炎症，对结膜炎、睑缘炎、睑

膜炎、泪囊炎、巩膜炎、角膜炎、虹膜炎等有效。

### 方28 眼科Ⅰ号片（华西医科大学附属医院）

〔组成〕 赤芍、丹参、丹皮、川芎、怀牛膝、旱莲、钩藤、白芍、黄芩、柴胡、荆芥炭、炒枳壳各4500克，蒺藜、白茅根、仙鹤草、夏枯草各9000克。

〔制法〕 ①取荆芥炭、炒枳壳粉碎80~100目筛，细粉（作吸收剂）备用。②取方中其余14味药和粉碎后的粗粉用煮提法加水煮提6次，每次煮提1小时，过滤，合并滤液，浓缩至稠膏状（大约15000毫升），放冷。③取稠膏加乙醇沉淀，使含醇量达60%，静置24小时，过滤。回收乙醇，并挥发至无醇味。浓缩至稠膏状。④取细粉和稠膏混合，搅拌均匀，分成小块，100~120℃干燥，粉碎制粒，过12~14目筛。⑤将制好的颗粒，加入0.5%硬脂酸镁和3%滑石粉混匀，压片即得。片重0.5克，含原生药7.5克，每袋装100片。共制12000片。

〔用法〕 口服。每日3次，每次8片，温水送服。

〔功效〕 清热散风，消炎止血。

〔主治〕 各类眼球出血，用于视网膜静脉周围炎，视网膜中央静脉栓塞，外伤眼内出血者。

### 方29 眼科Ⅱ号片（华西医科大学附属医院）

〔组成〕 茺蔚子、赤芍、川芎、郁金、丹参、当归、生地、红花、怀牛膝、莪术、茯苓、车前仁、焦山楂、枳壳、木瓜、神曲各6000克。

〔制法〕 ①取神曲粉碎过80~100目筛。细粉（作吸收剂）备用。②将方中前15味药用煮提法煮提6次，每次煮沸1小时，过滤，合并6次滤液，浓缩至稠膏状（大约22000毫

升),放冷。③将稠膏加乙醇沉淀,使含醇量达60%,静置24小时,过滤,回收乙醇,并挥发至无醇味,浓缩至稠膏状。④取细粉和稠膏混匀,分成小块,100~120℃干燥,粉碎制粒,过12~14目筛。⑤将制好的颗粒,加入3%滑石粉、0.5%硬脂酸镁混匀,压片即得。片重0.5克,含原生药9.5克,每袋装100片。共制12000片。

〔用法〕 口服。每日3次,每次8片,温水送服。

〔功效〕 活血化瘀。

〔主治〕 各类眼疾病,如中心性视网膜脉络膜病变,慢性葡萄膜炎,以及玻璃体混浊,和角膜新近瘢痕。对各类神经病变,如视神经炎、视神经网膜炎、视乳头血管炎、缺血性视神经病变,以及退行性眼病和视神经萎缩等。

### 方30 眼科Ⅳ号片(华西医科大学附属医院)

〔组成〕 赤芍、当归、川芎、生地、郁金、丹参、苏木、怀牛膝、地龙、菖蒲、木瓜、木通、香附、红泽兰、红花各6000克,麝香15克。

〔制法〕 ①取红花和麝香粉碎过80~100目筛,细粉(作吸收剂)备用。②将方中前14味药和粉碎后的粗粉用煮提法加水煮提6次,每次煮沸1小时,过滤,合并6次滤液,浓缩至稠膏状(大约20000毫升),放冷。③取稠膏加乙醇沉淀,使含醇量达60%,静置24小时,过滤,回收乙醇,并挥发至无醇味,浓缩至稠膏状。④取红花细粉和稠膏混合,搅拌均匀,分成小块,100~120℃干燥,粉碎制粒,过12~14目筛。⑤取制好的颗粒加入麝香粉、0.5%硬脂酸镁、3%滑石粉混匀,压片即得。片重0.5克,含原生药7.5克,每袋装100片。共制12000片。

〔用法〕 口服。每日3次，每次8片，温水送服。

〔功效〕 活血化瘀，疏通经络。

〔主治〕 同方29“眼科Ⅲ号片”。

### 方31 光明散（南京市中医院）

〔组成〕 甘石、荸荠粉各30克，朱砂、梅片各0.9克。

〔制法〕 共研极细末，至无声为度。

〔用法〕 点眼。

〔功效〕 去翳消炎。

〔主治〕 治沙眼胬肉，白睛生红筋，流泪肿痛。

### 方32 拨云散（南京市中医院）

〔组成〕 甘石27克，熊胆2.7克，珍珠2.4克，麝香、朱砂、姜汁、梅片各0.18克。

〔制法〕 共研极细末，至无声为度。

〔用法〕 点眼。

〔功效〕 消翳退云。

〔主治〕 蟹睛，翳膜，旋螺突出，黑睛凸凹翳，玛瑙翳。

### 方33 甲种眼药（成都市第一人民医院）

〔组成〕 飞海浮石500克，黄连21.9克，硼砂15.6克，朱砂6.25克，轻粉15.6克，薄荷冰3.125克，冰片50克，胡椒1个，珍珠3.125克。

〔制法〕 ①海浮石煨透水飞，研极细后取足量500克。②珍珠夹豆腐中煮沸半小时，研极细过筛。③朱砂水飞或研极细过100目筛，取足量6.25克。④冰片、薄荷冰、轻粉分别研细过筛。⑤余药研为细粉过筛，分次加入以上诸药混研极细至无声，色泽均匀为度。分装，每瓶药粉净重0.938克。

〔用法〕 先将细玻璃棒末端用冷开水打湿，蘸眼药少许

如粟米大，点于眼角内。

〔功效〕 清热，止痛，散翳障。

〔主治〕 红肿，生眼粪，流泪，羞明，一切暴发眼症。

### 方34 硃砂眼药（成都市第一人民医院）

〔组成〕 ①黄丹1000克，乌贼骨、冰片各62.5克，玛瑙、朱砂、熊胆各25克。②诃子（去核）625克，莪术375克，三棱250克，黄连62.5克，南星50克，栀子87.5克，菊花50克，菱蕤仁（打破）50克，蝉蜕37.5克，硃砂37.5克，细辛12.5克，川乌37.5克，大黄62.5克，红花37.5克，桃仁50克，花椒12.5克，谷精草25克，桑叶62.5克，黄柏37.5克，法半夏50克，蜂蜜2000克。

〔制法〕 第一类药物单称，黄丹过120目筛另存。乌贼骨去硬壳净62.5克研细粉与冰片混合乳至极细，余药分别研细过100目筛，再混研均匀。第二类药物：①蜂蜜于水浴上加热过滤，再继续蒸发部分水分。②其余药物加水淹过药面小火熬3次，每次煮沸后15分钟，将3次滤液共浓缩至适当稠度，加入蜂蜜水浴上再浓缩后，分次加入①内黄丹及混合粉末，边加药粉边搅动，直至药粉加完后搅拌较凉为度。

〔用法〕 用细玻璃棒点米大一粒于角膜上，闭目2小时后，用温开水洗净。

〔功效〕 退翳，明目。

〔主治〕 适用于新旧角膜云翳。

〔禁忌〕 红肿及有溃疡者禁用。

### 方35 炉硝散（成都市第一人民医院）

〔组成〕 ①羌活、黄芩、菊花、蔓荆子各225克，川芎、白芷各150克。②炉甘石375克，火硝60克，冰片75克。

〔制法〕 第一类药物用纱布包，加水淹过药面寸许煎熬2次，混合两次滤液浓缩成较稠的药汁。第二类药物的炉甘石煨透水飞，干燥后再研至极细无声为度，火硝、冰片分别研成细粉过100目筛，再将上药混合乳至均匀，将①内药汁加入调匀即得。

〔用法〕 每次挑药如米粒大小，涂于赘肉或睑球粘着之患处，闭目半小时即可洗去。每日1~2次（不要涂在黑眼珠上）。

〔功效〕 破血散瘀。

〔主治〕 睑球粘着，翼状赘肉。

### 方36 珍珠散（成都中医学院附属医院）

〔组成〕 珍珠、玛瑙、珊瑚各4.6克，硼砂、黄连、没药各1.5克，熊胆、龙脑各12.5克，血竭、朱砂各2.3克，麝香0.8克，炉甘石46克。

〔制法〕 珍珠用豆腐煮至豆腐呈蜂窝状时取出研为极细粉末，其余各药单研粉碎，过160目筛，用套色法混合均匀，紫外线消毒半小时，分装即得。

〔用法〕 外用。每日3次点眼，每次约半粒米。

〔功效〕 清热，明目，退翳。

〔主治〕 用于角膜血管翳。

### 方37 涩化丹（成都中医学院附属医院）

〔组成〕 薄荷、僵蚕、麻黄、黄连、芦荟、空青石各31克，赤石脂312克，炉甘石187克，细辛15克，紫草、胆草、草乌各12克，蔓荆子、血竭各3克，珊瑚、琥珀各9克，珍珠1.5克。

〔制法〕 ①赤石脂、炉甘石各研极细粉末混合。②薄荷、

僵蚕、麻黄、芦荟、细辛、紫草、胆草、草乌、蔓荆子等药共煎去渣，浸碎赤石脂、炉甘石细末，日晒夜露至全干，过160目筛。③珍珠用豆腐煮至豆腐呈蜂窝时取出；珊瑚用醋淬；空青石、琥珀、血竭单研粉碎过160目筛。以上各药粉用套色法混合均匀，紫外线消毒半小时后分装即得。每瓶2克。

〔用法〕 点患眼，每晚1次，点入大眼角内。

〔功效〕 消炎退翳。

〔主治〕 用于各种角膜、陈旧性翳子。

### 方38 抗炎眼药水 I (北京医科大学附属人民医院)

〔组成〕 野菊花35克，马尾连70克，金银藤70克，蒲公英60克，黄芩60克，板蓝根70克。

〔制法〕 取野菊花加蒸馏水，用蒸馏法提取，收集馏液850毫升备用。另取其余药材用蒸馏水冲洗后，与蒸馏器内的野菊花药渣合并，加蒸馏水煎煮3次，每次1小时，过滤。3次滤液合并浓缩至糖浆状（必要时在水浴上浓缩，以免糊锅），加2~3倍95%乙醇使含醇量达70%，搅匀，冷藏过夜。过滤，滤液回收乙醇，最后在水浴上蒸尽乙醇至无醇味。所得药液加注射用水适量，滴加氨试液至pH6，冷藏24小时以上，过滤，滤液加1%吐温-80、氯化苯甲烃胺0.05克，搅匀并与上述蒸馏液合并加注射用水至全量，过滤澄明，灭菌，分装即得。共制1000毫升。

〔用法〕 点眼，每日数次。

〔功效〕 清热解毒，消炎。

〔主治〕 急慢性结膜炎、病毒性角膜炎。

### 方 39 抗炎眼药水Ⅱ（北京医科大学附属人民医院）

〔组成〕 野菊花、蒲公英各 200 克。板蓝根 100 克，黄连 10 克（或 3 倍量三棵针），氯化钠 8 克，尼泊金 0.3 克。

〔制法〕 取野菊花、板蓝根、蒲公英、黄连，加蒸馏水浸泡后，煎煮 2 次，第一次 60 分钟，第二次 45 分钟，过滤，2 次滤液合并，滤液微火浓缩至 500 毫升，加 2 倍量 95% 乙醇，搅拌，放置 12 小时，滤除沉淀。滤液回收乙醇至醇尽，加蒸馏水至 900 毫升，以细流加入尼泊金水溶液，边加边搅拌（尼泊金加适量蒸馏水，加热使溶解）。最后加入氯化钠，加蒸馏水至全量，搅匀（用三羟氨基甲烷调 pH 约为 6）。用流通蒸气 100℃ 30 分钟热处理，置冰箱内放置 24 小时，反复过滤至澄明。分装，灭菌备用。共制 1000 毫升。

〔用法〕 点眼，每日数次。

〔功效〕 清热解毒，消炎。

〔主治〕 急性结膜炎。

### 方 40 藤菊蓝眼药水（北京市同仁医院）

〔组成〕 金银藤、野菊花各 1000 克，板蓝根、蒲公英各 500 克，吐温-80 30 毫升，硫柳汞 2.4 克，缓血酸胺 14.4 克。共制 12000 毫升。

〔制法〕 称取金银藤、野菊花、板蓝根、蒲公英，加蒸馏水煎煮 3 次。第一次加 8 倍量水煮沸 1 小时，第二、三次加 6 倍量水，煮沸 30 分钟。过滤，3 次滤液合并，浓缩至稠膏状。加 95% 乙醇使含醇量达 60%，静置过夜，或静置 24 小时。用滤纸过滤，滤液回收乙醇。按同法再加乙醇处理 2 次，最后将醇赶走。加蒸馏水至全量，煮沸 10 分钟，冷置 24 小

时。过滤，另将吐温-80用少量热水溶解后加入，再加入硫柳汞、缓血酸胺，最后加蒸馏水至全量，搅匀，过滤至澄明，灭菌，分装眼药瓶内。

〔用法〕 点眼，每日数次。

〔功效〕 清热解毒，消炎。

〔主治〕 暴发性火眼（流行性红眼病），急性结膜炎，病毒性眼炎。

#### **方41 洗眼方（天津市塘沽区向阳卫生院）**

〔组成〕 蒲公英 30克，菊花 15克。

〔制法〕 水煎成汤剂。

〔用法〕 取煎剂 1/2 内服，1/2 洗眼，每日薰洗数次。

〔功效〕 清热散风，消肿止痛。

〔主治〕 暴发火眼，目赤肿疼。

## 5. 耳 病

#### **方1 冰珠散（天津中医学院第二附属医院）**

〔组成〕 珍珠粉 1.8克，冰片 3克，寒水石 9克。

〔制法〕 将上药研极细末，过筛合匀。

〔用法〕 吹入耳内。

〔功效〕 消肿止痛，收敛疮面。

〔主治〕 耳病初起，肿胀疼痛，耳内出脓。

#### **方2 朱辰散（天津中医学院第二附属医院）**

〔组成〕 煅硼砂 150克，寒水石 15克，冰片 7.5克，珍珠粉 3克，朱砂 1.2克。

〔制法〕 除硼砂不须过眼药筛外，余药均过筛合匀。